

様式第 2 号その 11(第 4 条関係)

身体障害者診断書・意見書 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能(13 歳未満) 障害用

氏 名		年	月	日	生	男・女
住 所						
1 障 害 名 (部位を明記)		ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害				
2 原因となった疾病・外傷名		10 20 30 40 50 交 通、労災、その他の事故、戦傷、戦災自 然災害、疾病、先天性、その他() 60 70 80 90				
3 疾病・外傷発生年月日		年	月	日	場 所	
4 参考となる経過・現症(エックス線写真及び検査所見を含む。)						
障害固定又は障害確定(推定) 年 月 日						
5 総 合 所 見						
将来再認定 要 (重度化・その他) 不要 再認定年月 年 月						
6 その他の参考となる合併症状						
上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 年 月 日 勤務先 (所在地・名称・電話番号) 身体障害者福祉法 診療担当科名 科 第 15 条指定医師氏名						
身体障害者福祉法第 15 条第 3 項の意見 〔障害程度等級についても参考意見を記入〕 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に ・該当する (級相当) ・該当しない						

- 〔注意〕
- 1 障害名には現在起っている障害、例えば両眼視力障害、両耳ろう、右上下肢麻痺、心臓機能障害等を記入し、原因となった疾病には、緑内障、先天性難聴、脳血管障害、僧帽弁膜狭窄等原因となった疾患名を記入してください。

2 障害区分や等級決定のため、大阪府から改めて診断内容についてお問い合わせする場合があります。

1 HIV 感染確認日及びその確認方法

HIV 感染を確認した日 年 月 日

小児の HIV 感染は、原則として以下の(1)及び(2)の検査により確認される。(2)についてはいずれか一つの検査による確認が必要である。ただし、周産期に母親が HIV に感染していたと考えられる検査時に生後 18 か月未満の小児については、さらに以下の(1)の検査に加えて、(2)のうち「HIV 病原検査の結果」又は(3)の検査による確認が必要である。

(1) HIV の抗体スクリーニング検査法の結果

	検 査 法	検 査 日	検 査 結 果
判定結果		年 月 日	陽性、陰性

注 1 酵素抗体法(ELISA)、粒子凝集法(PA)、免疫クロマトグラフィー法(IC)等のうち一つを行うこと。

(2) 抗体確認検査又は HIV 病原検査の結果

	検 査 名	検 査 日	検 査 結 果
抗体確認検査の結果		年 月 日	陽性、陰性
HIV 病原検査の結果		年 月 日	陽性、陰性

注 2 「抗体確認検査」とは、Western Blot 法、蛍光抗体法(IFA)等の検査をいう。

注 3 「HIV 病原検査」とは、HIV 抗原検査、ウイルス分離、PCR 法等の検査をいう。

(3) 免疫学的検査所見

検査日	年 月 日
IgG	mg/dl

検査日	年 月 日
全リンパ球数(①)	/ μ l
CD4 陽性 T リンパ球数(②)	/ μ l
全リンパ球数に対する CD4 陽性 T リンパ球数の割合([②]/[①])	%
CD8 陽性 T リンパ球数(③)	/ μ l
CD4/CD8 比([②] / [③])	

2 障害の状況

(1) 免疫学的分類

検査日	年 月 日	免 疫 学 的 分 類
CD4 陽性 T リンパ球数	/ μl	重度低下・中等度低下・正 常
全 リンパ球数 に対する CD 4 陽性 T リンパ球数の 割合	%	重度低下・中等度低下・正 常

注 4 「免疫学的分類」欄では「身体障害認定基準」6 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害(2)のイの(イ)による程度を○で囲むこと。

(2) 臨床症状

以下の臨床症状の有無(既往を含む。)について該当する方を○で囲むこと。

ア 重度の症状

指標疾患がみられ、エイズと診断される小児の場合は、次に記載すること。

指標疾患とその診断根拠	

注 5 「指標疾患」とは、「サーベイランスのための HIV 感染症/AIDS 診断基準」(厚生省エイズ動向委員会、1999)に規定するものをいう。

イ 中等度の症状

臨 床 症 状	症 状 の 有 無
30 日以上続く好中球減少症(<1,000/ μl)	有 ・ 無
30 日以上続く貧血(<Hb 8g/dl)	有 ・ 無
30 日以上続く血小板減少症(<100,000/ μl)	有 ・ 無
1 ヶ月以上続く発熱	有 ・ 無
反復性又は慢性の下痢	有 ・ 無
生後 1 か月以前に発症したサイトメガロウイルス感染	有 ・ 無
生後 1 か月以前に発症した単純ヘルペスウイルス気管支炎、肺炎又は食道炎	有 ・ 無
生後 1 か月以前に発症したトキソプラズマ症	有 ・ 無

6 ヶ月以上の小児に 2 か月以上続く口腔咽頭カンジダ症	有 ・ 無
反復性単純ヘルペスウイルス口内炎(1 年以内に 2 回以上)	有 ・ 無
2 回以上又は 2 つの皮膚節以上の帯状疱疹	有 ・ 無
細菌性の髄膜炎、肺炎または敗血症	有 ・ 無
ノカルジア症	有 ・ 無
播種性水痘	有 ・ 無
肝炎	有 ・ 無
心筋症	有 ・ 無
平滑筋肉腫	有 ・ 無
HIV 腎症	有 ・ 無
臨床症状の数 [個] ……………①	

注 6 「臨床症状の数」の欄には「有」を○で囲んだ合計数を記載すること。

ウ 軽度の症状

臨 床 症 状	症 状 の 有 無
リンパ筋腫脹(2 カ所以上で 0.5cm 以上。対称性は 1 カ所とみなす。)	有 ・ 無
肝腫大	有 ・ 無
脾腫大	有 ・ 無
皮膚炎	有 ・ 無
耳下腺炎	有 ・ 無
反復性又は持続性の上気道感染	有 ・ 無
反復性又は持続性の副鼻腔炎	有 ・ 無
反復性又は持続性の中耳炎	有 ・ 無
臨床症状の数 [個] ……………②	

注 7 「臨床症状の数」の欄には「有」を○で囲んだ合計数を記載すること。