

苗木の種類

樹 種	特 性
ア ラ カ シ ブナ科 (常緑広葉樹・高木)	中庸樹～陰樹で、生長はやや速く、萌芽力大で刈り込みに耐えるとともに、煙害、風害、大気汚染に強い。堅果は、通常どんぐりと称する一種で楕円形をなし１０月に結実する。
キ シ モ ク セ イ モクセイ科 (常緑広葉樹・高木)	中庸樹で生長はやや速く、雌雄異株で、日本には雄木だけ存在し、花は９～１０月に着き黄色で芳香がある。
ベ ニ カ ナ メ モ チ バラ科 (常緑広葉樹・小高木)	中庸樹～陽樹で生長はやや速く、萌芽力大で刈り込みに耐え、移植はやや困難で、耐潮性があり、生垣として春の新葉とくに紅色が著しい。
ト ウ ネ ズ ミ モ チ モクセイ科 (常緑広葉樹・小高木)	陰樹で生長は、きわめて速く、陽光地に耐え萌芽力大で強剪定に耐える。また、大気汚染に強く土質を選ばず６月に白い花をつけ、果実は１１月頃に紫黒色に熟す。
サ シ ゴ ジ ユ スイカズラ科 (常緑広葉樹・小高木)	陰樹であるが、陽光地に耐え、生長が速く萌芽力があり、刈り込みに耐え、耐潮性があり大気汚染には、やや耐える。また、花は６～７月に開花し、果実は、９～１０月に成熟し、赤熟の後、青黒色となる。
カ イ ズ カ イ ブ キ ヒノキ科 (常緑針葉樹・高木)	陽樹で生長が速く、潮風に強く、とくに大気汚染に非常に強い。浅根性で、耐潮性があり、刈り込みは好まない。刈り込みをしたり、下葉が繁茂しすぎると、刺状のスギ葉となることがある。
イ シ マ キ マキ科 (常緑針葉樹・高木)	陰樹であるが陽地でも育ち生長遅いが、萌芽力があり、刈り込みに耐える。また、耐潮性があり湿気の多い所に適する。 ５～６月に開花し、９～１１月球形の種子をつける。
サ ザ シ カ ツバキ科 (常緑広葉樹・小高木)	やや陰樹で生長は遅いが、萌芽力があり、刈り込みに耐え、耐潮性があるが、やや寒さを嫌う。また、開花期は１０～３月で果期は９～１０月である。
イ シ ツ ゲ モチノキ科 (常緑広葉樹・高木)	陰樹であるが陽地でも育ち生長遅く萌芽力があり、刈り込みに適し、耐潮性、耐煙性があり、大気汚染に強い。 ６～７月に白色の雄花を着け、１０～１１月に球形の黒色核果を成熟する。
ウ バ メ ガ シ ブナ科 (常緑広葉樹・高木)	中庸樹～陽樹で生長は遅いが、萌芽力大で、刈り込みに耐え、耐潮性があり、乾燥、大気汚染に強い。 雌花は、４～５月に開花し、翌年１０～１１月に成熟した堅果（どんぐり）となる。

苗木の種類

ク　　チ　　ナ　　シ アカネ科 (常緑広葉樹・低木)	中庸樹～陰樹で生長はやや遅く、萌芽力があり、実を熟しても、口を開かないことから口無という。 花期は、6～7月上旬に白い花をつけ、果期は10～12月である。
ボ　　ッ　　ク　　ス　　ウ　　ッ　　ド ツゲ科 (常緑低木)	生長は速く、萌芽力は大きい。 病虫害は少ない。(別名　スドウツゲ)
イングリッシュアイビー ウコギ科 (常緑蔓性)	陰樹～中庸樹で生長は速い。 蔓は、木質化しないので軟らかく、気根を発生し他物に付着する。 壁面のざらざらしている所に絡ませる。